

Hemochromatose en vaccinatie tegen Covid-19

Diverse leden hebben vragen gesteld over de vaccinatie tegen Covid-19. Er bestaat waarschijnlijk over dit onderwerp meer behoefte aan informatie. We hebben overleg gehad met de leden van de Medische Advies Raad en delen mede dat:

- patiënten met hemochromatose geen extra risico lopen op besmetting met Covid-19, zij kunnen de oproep voor vaccinatie van de GGD of van de huisarts afwachten.
- er geen redenen bekend zijn om aan een bepaald vaccin de voorkeur te geven, dus patiënten met hemochromatose kunnen het middel dat voor hen gepland is ontvangen.
- wat betreft het moment van de vaccinatie ten opzichte van een aderlating of erythrocytaferese, er geen reden is om vaccinatie of behandeling uit te stellen. In de praktijk is het wellicht beter om tussen vaccinatie en aderlating/erythrocytaferese enkele dagen de tijd te nemen. Sommige mensen hebben van een aderlating/erythrocytaferese wat last en de vaccinatie kan gedurende 1-2 dagen wat temperatuursverhoging veroorzaken.

Het algemene advies om op de dag van de aderlating/erythrocytaferese voldoende drinkvocht te gebruiken, willen we nog eens benadrukken.