


HVN Doetinchem za 29 mrt 2025: vragen



Vraag van een HVN lid:

Een flink aantal mensen heeft de afgelopen jaren wegens ernstig overgewicht een maagverkleiningsoperatie ondergaan, zogenaamde Bariatrische Chirurgie.

Hoe beïnvloedt dit de opname van ijzer bij een Hemochromatosepatiënt?

Anatomie

Ijzer in ons voedsel 15 mg per dag
opname via de darm 2 mg per dag

opgeslagen in lever en beenmerg

Bij hemochromatose: ijzeropname 3-5 mg per dag 2




Adjustable
Gastric Band
(AGB)



Vertical Sleeve
Gastrectomy
(VSG)




Roux-en-Y
Gastric Bypass
(RYGB)



Biliopancreatic
Diversion With a
Duodenal Switch
(BPD-DS)

Intestinal sites of nutrient absorption



Sinds 1996 bekend met

1. **Hemochromatose , heterozygoot**
2. **Porphyria Cutanea Tarda**

Therapie: jaarlijks 3 keer aderlaten tot nov 2022, daarna Hb 7,3, dus te laag voor aderlaten .

Aan de MDI arts gevraagd om onderzoek: aug 2023: Diagnose **multiple myeloom type IgG** behandeld met daratumab -bortezomib-dexametason sinds sept 2023


Nu klinisch stabiele ziekte in onderhoudstherapie daratumumab sinds juni 2024
Afgelopen week was mijn Hb 9,1
Op mijn verzoek **ferritine** mee genomen, is de laatste maanden **rond de 20**

Vraag:


1. komt de combinatie van de 3 ziekten vaker voor .
2. wat is er nog over van de ijzerstapelings kwalen
3. Ik ben benieuwd of er meer kennis is over deze combinatie is

Opmerking:


Ik word niet meer behandeld door de MLD arts en de oncoloog besteed geen aandacht aan de porfyrie,
Afgelopen zomer werd ik wel snel bruin ,even als afgelopen dagen .



Haemoglobine / Hemoglobine / Hb



Haem = Porphyrine ring + IJzer (Fe)



Porphyrria Cutanea Tarda (PCT)

UV licht zon



1. ijzer stimuleert porphyrinesynthese in lever; bij drager van C282Y iets meer ijzer?
2. aderlating om ijzervoorraad te verlagen heeft gunstig effect op de huidafwijkingen
3. monitoren aan de hand van ferritine en Hb